Oxygénothérapie chez l'enfant en soins intensifs

Caroline Haggemacher
Kinésithérapeute
Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola
ULB

SIZ Nursing – Janvier 2015

Frey B., Shann F. « Oxygen Administration in infants » Arch Dis Fetal Neonatal Ed 2003; 88:F84-F88

Caroline Haggemacher – SIZ Nursing – janv 2015

Lunettes nasales (LF)

- Néonatal : max 2 L/min.
- Nourrisson: max. 3 L/min
- Enfant - Adulte : max. 4 L/min.

Aubertin G, Marguet C, Delacourt C et al. Recommandations pour l'oxygénothérapie chez l'enfant en situations aiguës et chroniques : évaluation du besoin, critères de mise en route, modalités de prescription et de surveillance. Arch Pediatr 2012;19:528—36.

Caroline Hagenmacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Lunettes nasales (LF)

- Humidification non chauffée par Aquapack
- Assure une FiO₂ modérée (35%-40%)
- Nettoyage 1 fois par jour et changer 1 fois semaine minimum

Aubertin G, Marguet C, Delacourt C et al. Recommandations pour l'oxygénothérapie chez l'enfant en situations aiguës et chroniques : évaluation du besoin, critères de mise en route, modalités de prescription et de surveillance. Arch Pediatr 2012;19:528—36.

Caroline Hagenmacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Lunettes nasales (LF)

- Fixation soins
- Protection pour la peau
- Lunettes $\leftrightarrow$ aérosol
- Présence sonde gastrique

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Masque à oxygène

- Aquapack
- Assure une FiO₂ modérée (35%-40%)
- S'enlève facilement
- Interfère l'alimentation

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Non Rebreathing Mask

- Valve entre le masque et le réservoir
- Le débit nécessaire pour que le réservoir soit bien gonflé est de 12 - 15 L/min
- Aquapack
- Nettoyage 1 fois par jour et changer 1 fois semaine minimum

Figure 3.13 Masque facial: lors de l'expiration, les valves unidirectionnelles permettent l'exhalation et empêchent la ré-inhalation de CO₂.

Figure 3.12 Masque facial: lors de l'inspiration grâce aux valves unidirectionnelles, l'O₂ provient uniquement du réservoir et de la source d'oxygène.

Caroline Haggenmacher - Form. SIZ Nursing - Juin 2015 2012

Non Rebreathing Mask

- La concentration d'oxygène délivrée est dépendante de la présence des valves sur les trous expiratoires.

- Deux valves = +/- 100 %
- une valve = +/- 80 %
- sans valve = +/- 60 %

Figure 3.14 Masque facial: une des valves unidirectionnelles est retirée ce qui permet l'entrée d'air lors de l'inspiration.

Caroline Haggenmacher - SIZ Nursing - janv 2015

Non Rebreathing Mask

- Le sevrage de la concentration d'oxygène
 - placer le masque sur un débit litre avec mélangeur
 - diminuer la FiO₂ sur le mélangeur tout en gardant le même débit.
 - Lors d'une FiO₂ sur le mélangeur de 40 à 50% on peut envisager de passer aux lunettes nasales.

Caroline Haggemacher – SIZ Nursing - janv 2015

Cloche de Hood

- Utilisation d'un débit élevé → 2-3 l/kg/min
- Utilisation d'un oxymètre
- Humidification
- Risque accumulation CO₂

Frey B., Shann F. « Oxygen Administration in infants » Arch Dis Fetal Neonatal Ed 2003; 88:F84-F88

Caroline Haggemacher – SIZ Nursing - janv 2015

Oxygénothérapie à Haut débit

- Couvrir le débit de pointe inspiratoire du patient
- L'humidification active
- Un effet PEP
- Des interfaces pédiatriques adaptés

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

Optiflow

La FI_{O_2} réellement inspirée :
Interaction entre le débit délivré et
l'activité respiratoire du patient.

RESPIRATORY
humidification

> Délivrance d'oxygène pur
sur lunettes nasales,

- des inconnues :

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

> Cas des lunettes nasales :

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

> Il n'est pas possible de le connaître précisément, ni de le mesurer en routine.

> Il dépend du patient : de son poids, de son activité respiratoire spontanée, de son état (ex. sommeil), et d'éventuelles pathologies respiratoires associées.

> Partant de cela, comment peut-on tout de même l'estimer ?

>> Une étude (Walsh M, Case Western Reserve University, Cleveland, USA. Oxygen delivery through nasal cannulae to preterm infants : can practice be improved ? Pediatrics 2005) permet une estimation simple à mettre en œuvre :

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

> Cela donne ce guide *Indicatif* :

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

Effet Peep

> La littérature confirme l'existence d'un effet « CPAP like » généré par les hauts débits.

>> Il y est décrit comme :

- D'une valeur plutôt imprédictible car dépendant de plusieurs paramètres :

- > Le niveau de débit délivré,
- > Le degré d'étanchéité entre les canules et les narines,
- > La respiration bouche ouverte ou fermée,
- > Le poids du patient.

- Les valeurs mesurées dans diverses études vont de <1 cmH₂O à environ 4 cmH₂O, en fonction des paramètres ci-dessus.

- Kubicka Z, depts of pediatrics, respiratory & Physiology, Dartmouth Medical School & Dartmouth-Hitchcock Medical center, Lebanon, New Hampshire. Pediatrics 2008.

Fisher & Paykel HEALTHCARE

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

Optiflow NHF
Nasal High Flow

← ? →

Optiflow THF
Tracheal High Flow

F & P Optiflow Junior				
Produit	Code de l'élément	Plage de poids approx.	Débit max. (L/min)	Fixations de rechange
Cannule nasale Optiflow Junior				
Taille prématurés	OPT312	<2 kg	8	OPT010
Taille néonatal	OPT314	1-8 kg	8	OPT012
Taille nourrisson	OPT316	3-15 kg	20	OPT012
Taille pédiatrie	OPT318	12-22 kg	25	OPT012
Kit de tuyaux Optiflow junior	RT330 pour MR850, 900PTS31 pour AIRVO 2	N/A	Voir Optiflow Junior Nasal	N/A

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Placement des canules

Changement des collants

Caroline Haggemacher – SIZ Nursing - janv 2015

Mise en place

Voies aériennes dégagées

- Position du patient
- Rinçage du nez ou aspiration si nécessaire

Caroline Haggemacher – SIZ Nursing - janv 2015

Ouverture VA : nourrisson vs grand enfant

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

21

Mise en place

- Humidification par Aquapack (pas chauffée)
- Protection pour la peau
- Connecter à un débit Oxygène ou mélangeur mis sur 100%

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing – janv 2015

Surveillance

- Saturation via un Oxymètre de pouls
- Examen clinique :
 - Fréquences respiratoires
 - Fréquences cardiaques
 - Signes de lutttes respiratoire
 - Cyanose
 - Geignements
 - Prises alimentaires
 - Troubles de la consciences, sueurs, auscultation pulmonaire
- Gazométrie

Aubertin G, Marguet C, Delacourt C et al. Recommandations pour l'oxygénothérapie chez l'enfant en situations aiguës et chroniques : évaluation du besoin, critères de mise en route, modalités de prescription et de surveillance. Arch Pediatr 2012;19:528—36.

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Particularités physiologiques enfant

- Demande métabolique

adulte : cons O₂ : 3 à 4 ml/kg/min

enfant : cons O₂ : 6 à 8 ml/kg/min

- Réserve pulmonaire faible (CRF, cage thoracique plus compliante, fibres musculaires type II)
- Immaturité centre respiratoire
- Rôle diaphragme (30%) dans mécanique respiratoire

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Surveillance

■ Désaturation ...

- Installation patient ouverture voies aériennes
- Rinçage du nez ou aspiration
- Patient cardiaque
- Détresse respiratoire augmenté
-

Aubertin G, Marguet C, Delacourt C et al. Recommandations pour l'oxygénothérapie chez l'enfant en situations aiguës et chroniques : évaluation du besoin, critères de mise en route, modalités de prescription et de surveillance. Arch Pediatr 2012;19:528—36.

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Surveillance

Signes cliniques détresse respiratoire :

- Fréquences respiratoires
- Tirages intercostales, sous costales sus sternales
- Cyanose
- Geignements
- Battements des ailes du nez
- Bruits respiratoires

Aubertin G, Marguet C, Delacourt C et al. Recommandations pour l'oxygénothérapie chez l'enfant en situations aiguës et chroniques : évaluation du besoin, critères de mise en route, modalités de prescription et de surveillance. Arch Pediatr 2012;19:528—36.

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Merci

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

« Oxygénothérapie à haut débit en pédiatrie
Enquête nationale »

Mémoire du master en pédiatrie 2013-2014
Dr Vens Daphné

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

Un total de 102 institutions comprenant au moins un service de pédiatrie a été contacté et 99 ont répondu

- utilisées dans 21% des institutions
- 52% des services utilisateurs sont des services de pédiatrie banalisés
- utilisées à tous les âges
- 47% utilisent un protocole interne médical
- Instaurées dans la bronchiolite (95%), la crise d'asthme (57%), la bronchopneumonie (42%).

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015

- Les bénéfices rapportés :
 - diminution de mise en VNI (52%),
 - diminution du nombre de transfert (33%)
 - la facilité d'emploi (43%)
- Dans 43% des centres utilisateurs, un support ventilatoire plus important n'a jamais été nécessaire
- 20% des centres ont noté des effets secondaires :
 - inconfort pour un petit nombre de patients
 - des lésions cutanées ou de la muqueuse nasale
 - Aucun n'a rapporté de pneumothorax.

Caroline Haggemacher – SIZ.Nursing - janv 2015