Physiologie cardiovasculaire appliquée à l'anesthésie-réanimation

Philippe Van der Linden MD, PhD
CHU Brugmann-HUDERF

Physiologie cardiovasculaire appliquée à l'anesthésie-réanimation

- ✓ La circulation systémique
- ✓ Le cœur
- ✓ Le débit cardiaque et sa régulation

La circulation systémique

- ✓ Composants
- ✓ Caractéristiques physiques de la circulation systémique
- ✓ Caractéristiques physiques du sang
- ✓ Déterminants et mécanismes de contrôle du flux sanguin tissulaire
- ✓ Régulation de la pression artérielle

La circulation systémique: composants

- ✓ Artères: transport du sang à haute pression → tissus
- ✓ Artérioles (artères dont le diamètre est $< 200 \mu$): contrôle du flux sanguin dans les capillaires.
Méta-artérioles $<$ des artérioles et se ramifient en un réseau de 10 à 100 capillaires
- ✓ Capillaires: transfert O₂, éléments nutritifs et métabolites
- ✓ Veines et veinules: transport du sang à faible pression des tissus vers le cœur. **Parois musculaires !**

La circulation systémique

- ✓ Contient 80% du volume sanguin circulant

Pression pulsée

- ✓ Pression pulsée = P systolique – P diastolique
- ✓ Reflète l'éjection intermittente de sang dans l'aorte
- ✓ Facteurs modifiant la pression pulsée:
 - Volume d'éjection systolique du VG
 - Vitesse du flux sanguin
 - Compliance du réseau artériel

Pression pulsée

- ✓ Variations de la pression pulsée
 - Physiologique: du centre vers la périphérie en fonction de la diminution de compliance des vaisseaux et de l'importance de l'onde réfléchie
- ✓ Pouls paradoxal: ↓ pression systolique > 10 mm Hg à l'inspiration
- ✓ Pouls « alterne »: alternance de pouls bien frappé et de pouls plus faible
- ✓ Déficit de pouls: ≠ pouls auscultatoire et pouls radial

Circulation systémique: pressions

	Valeur moyenne (mm Hg)	Extrêmes (mm Hg)
Pression artérielle		
systolique	120	90-140
diastolique	80	70-90
moyenne	92	77-97
Pression télé- diastolique VG	6	0-12
Oreillette gauche	8	2-12
onde a	10	4-16
onde v	13	6-20
Oreillette droite	5	3-8
onde a	6	2-10
onde c	5	2-10
onde v	3	0-8

Les pressions cardiaques et vasculaires

Les pressions auriculaires

a: contraction auriculaire
c: contraction du VD
x: relaxation auriculaire
v: remplissage auriculaire
y: vidange de OD dans VD

Effets de la pression hydrostatique

0.77 mmHg/cm

Mesure des pressions

- ✓ Point de référence: niveau de la valve tricuspide (pas d'effet de la pression hydrostatique sur la mesure des pressions artérielle et veineuse à ce niveau). Correspond aux 2/3 de l'épaisseur du thorax mesuré à partir du plan de la table
- ✓ $10 \text{ mmHg} = 13,6 \text{ cm H}_2\text{O}$

Caractéristiques physiques du sang

Effet de l'hématocrite sur la viscosité dépend largement du « shear stress » (fction de la vitesse circulatoire)

Déterminants du flux sanguin tissulaire

- ✓ Flux sanguin tissulaire = $\frac{P \text{ entrée} - P \text{ sortie}}{\text{Resistance}}$
- ✓ Résistance = $8l\eta/\pi r^4$ (Loi de Poiseuille)
- ✓ Distensibilité vasculaire: veines = 6-10x celle des artères
Pression critique de fermeture: 20 mmHg
Pression circulatoire moyenne: 7 mmHg
- ✓ Compliance vasculaire: $\Delta V / \Delta P$; ± 100 ml/mmHg
Beaucoup plus grande au niveau des veines que des artères

Contrôle du flux sanguin tissulaire

- ✓ Mécanismes locaux
- ✓ Réponses du système nerveux autonome
- ✓ Réponse hormonales

	ml/min	ml/min.100g	% CO
Cerveau	750	50	15
Coeur	225	75	5
Foie	1450	100	29
Reins	1000	320	20
Muscles	750	4	15
Peau	400	3	8
Autres tissus	425	2	8

Contrôle du flux sanguin tissulaire

- ✓ Contrôle local du flux sanguin
 - Besoins métaboliques (O_2 , glucose, acides gras...)
- ✓ Auto-régulation du flux sanguin
 - Maintien d'un flux sanguin $\pm$ constant sur une plage étendue de pression artérielle moyenne
- ✓ Contrôle du flux sanguin à long terme
 - Modification de la densité vasculaire des tissus (ex: dysplasie rétrolentale)

Contrôle du flux sanguin tissulaire

- ✓ Rôle du système nerveux autonome: redistribution du flux sanguin entre les organes
 - Importance du système sympathique α -adrénergique
 - Centre vasomoteur
 - Partie supérieure: transmission des influx vasoconstricteurs
 - Partie médiane et inférieure: fonction inhibitrice

Contrôle du flux sanguin tissulaire

- ✓ Contrôle hormonal du flux sanguin
 - Effet vasconstricteur: adrénaline, noradrénaline, angiotensine, ADH
 - Effet vasodilatateur: bradykinine, sérotonine, histamine, prostaglandines
 - Rôle de facteurs chimiques locaux: K^+ , H^+ , CO_2

Régulation de la pression artérielle

- ✓ Pression artérielle: élément contrôlé $\propto$ débit cardiaque
- ✓ Maintien de la pression artérielle: $\propto$ modifications inverses du débit cardiaque et des résistances vasculaires systémiques
- ✓ PAM: le déterminant du flux sanguin tissulaire
- ✓ Mécanismes de régulation: court – moyen – long terme
- ✓ Variations physiologiques: respiratoires, 2^{dares} aux « ondes vasomotrices »

Régulation de la pression artérielle: mécanismes à court terme

- ✓ Baro-réflexes
 - Haute pression (aortique et carotidien)
 - Basse pression (auriculaires et ventriculaires)
- ✓ Chémo-reflexes
- ✓ Réflexe ischémique du système nerveux central

Les baro-réflexes à haute pression

- ✓ Baro-récepteurs situés dans la paroi de la crosse aortique et des carotides internes

Les réflexes à basse pression

- ✓ Récepteurs atriaux à basse pression comparables aux baro-récepteurs des grosses artères
- ✓ ↑ pression auriculaire:
 - Vasodilatation
 - Augmentation du rythme cardiaque par action sur le nœud sinusal

Les chémo-réflexes

- ✓ Cellules chimio-sensibles situés dans les corps carotidiens et aortiques
- ✓ Sensibles à O_2 , H^+ et CO_2
- ✓ Réponse importante pour $PA < 80$ mmHg
- ✓ Impliqués également dans la réponse ventilatoire à l'hypoxie ($PaO_2 < 60$ mmHg)

Régulation de la pression artérielle: mécanismes à moyen terme

✓ Phénomène de tension-relaxation (de + 30% à -15% du volume circulant))

✓ Mécanismes hormonaux

- Système adrénergique
- Système rénine-angiotensine
- Hormone anti-diurétique (ADH)

Vasoconstriction

✓ Passage de liquide trans-capillaire

Régulation de la pression artérielle: mécanismes à long terme

- ✓ Modification de la volémie: élimination/rétention de Na^+ et d'eau par les reins
 - Système rénine-angiotensine
 - Aldostérone
 - ADH

Régulation de la pression artérielle: effets de l'anesthésie

Dépression des baroréflexes: effet central par inhibition
de la réponse sympathique

- ↓ Tolérance à l'hémorragie
- ↓ Adaptation aux changements de position
- ↑ Gravité du choc anaphylactique

Le coeur

- ✓ Organe musculaire et de conduction partageant avec les vaisseaux le rôle de faire circuler le sang dans l'organisme
- ✓ Architecture fonctionnelle
- ✓ Fonction cardiaque

Architecture fonctionnelle du myocarde

✓ Fibres musculaires enroulées à la façon d'un turban:

- Contraction: ↓ diamètre et raccourcissement longitudinal
- Apex se contracte avant la base: onde « péristaltique » assurant la progression du sang

Anatomie fonctionnelle du myocarde

✓ Rôle du péricarde

- Fonction mécanique: empêche une dilatation excessive du cœur en diastole
- Fonction de membrane
- Fonction ligamentaire

Anatomie fonctionnelle du myocarde

- ✓ Interdépendance ventriculaire
 - Volumes d'éjection s'équilibrent par le biais d'adaptation de la précharge et de la postcharge
 - Adaptation d'un ventricule à des conditions de charge inadéquates se fait au détriment de l'autre

Cycle contraction-relaxation cardiaque

✓ Contraction

- Interaction entre les molécules d'actine et de myosine dépendant de $[Ca^{++}]$ libre dans la cellule
- Le calcium modifie la forme des protéines régulatrices (troponines)
- La relation entre force et $[Ca^{++}]$ est sigmoïde

Cycle contraction-relaxation cardiaque

✓ Relaxation

- Phénomène actif lié à la reprise du calcium par le réticulum sarcoplasmique
- Se termine avant la fin de la diastole et dépend des conditions de charge des fibres musculaires
- Facteurs clés: affinité de la troponine C pour le calcium et vitesse de recaptage du calcium par le réticulum sarcoplasmique

Le cycle cardiaque

Le travail cardiaque

- ✓ Produire une pression et par là faire progresser le sang dans l'arbre vasculaire

Le travail cardiaque

Le travail cardiaque

- ✓ E_{max} : reflète l'inotropisme
 - ✓ E_a : index de postcharge ventriculaire: correspond aux variations de l'élastance maximale de l'aorte à son origine
-
- ✓ Travail global du ventricule: travail d'éjection ventriculaire (TEV) + l'énergie potentielle du ventricule (EP)

La fraction d'éjection (FE)

- ✓ FE = volume d'éjection systolique / volume télédiastolique
= 80 ml / 120 ml: 66%
- ✓ $FE = 1 - PTS / (VTD \times E_{max})$
 - PTS: pression télésystolique du VG
 - VTD: volume télédiastolique
 - E_{max} : inotropisme
- ✓ $FE = E_{max} / (E_{max} + E_a)$

Fonction ventriculaire: la précharge

- ✓ La précharge détermine le degré d'étirement des fibres myocardiques (= le volume télédiastolique ventriculaire)
- ✓ Le retour veineux détermine la précharge ventriculaire

- Masse sanguine
- Tonus veineux
- Systole auriculaire
- Régime ventilatoire

- ✓ Remplissage diastolique: 80% < phase de remplissage rapide, 20% < systole auriculaire

Fonction ventriculaire: la postcharge

- ✓ « Tout ce qui s'oppose à l'éjection ventriculaire »
 - Dynamique ventriculaire
 - Résistances vasculaires
 - Compliance artérielle

Fonction ventriculaire: fréquence cardiaque

- ✓ Rôle complexe sur le débit cardiaque
 - Effets directs sur le coeur
 - Effets indirects par le biais des baroréflexes
- ✓ Fréquence optimale pour laquelle le débit cardiaque l'est aussi en fonction de la précharge: vers 120/min
- ✓ Une bradycardie importante n'augmente pas le volume télédiastolique du fait de l'inextensibilité du péricarde

Pression artérielle et débit coronaire

Déterminants du débit cardiaque

Débit cardiaque =

rythme cardiaque x volume d'éjection systolique

Déterminants du débit cardiaque

- ✓ Le retour veineux est un déterminant plus important du débit cardiaque que la contractilité myocardique
- ✓ Les besoins métaboliques contrôlent le débit cardiaque en modifiant la résistance au flux sanguin tissulaire
- ✓ Le système sympathique ↑ le débit cardiaque
 - ✓ ↑ rythme cardiaque
 - ✓ ↑ volume d'éjection systolique
 - ✓ ↑ contractilité
 - ✓ ↑ retour veineux

Rôle du retour veineux dans la régulation du débit cardiaque

$$\text{Retour veineux} = \frac{\text{PSM} - \text{POD}}{\text{RRV}}$$

RRV

- PSM: pression systémique moyenne de remplissage
- POD: pression oreillette droite
- RRV: résistance au retour veineux

Courbes de retour veineux

Fonction cardiaque et retour veineux

Hemodilution & Cardiac Output

Hemodilution & Cardiac Output

Merci de votre attention

Le travail cardiaque