

ERC 2005 VS ERC 2010

QUIZZ

Combien d'infirmier(e)s ?

- En USI ?
- En SUS ?



1. Quelles arythmies sont à classer dans les défibrillables?

- a) FV
- b) AESP
- c) TV
- d) Asystolie



1. Quelles arythmies sont à classer dans les défibrillables?

- a) **FV**
- b) ~~AESP~~
- c) **TV**
- d) ~~Asystolie~~



2. Avec quelle intensité devons-nous administrer le premier choc?

- a) 150 à 200 j (biphasique)
- b) 360 j (monophasique)
- c) 200 j si l'on ne connaît pas le type de défibrillateur
- d) Progressivement en commençant par 150 j



2. Avec quelle intensité devons-nous administrer le premier choc?

- a) **150 à 200j (biphasique)**
- b) **360 j (monophasique)**
- c) **200 j si l'on ne connaît pas le type de défibrillateur**
- d) ~~Progressivement en commençant par 150j~~



3. Immédiatement après l'administration du premier choc?

- a) Evaluation du rythme
- b) Evaluation du pouls
- c) RCP 30:2
- d) Administrer le second choc



3. Immédiatement après l'administration du premier choc?

- ~~a) Evaluation du rythme~~
- ~~b) Evaluation du pouls~~
- c) **RCP 30:2**
- ~~d) Administrer le second choc~~



4. A quelle vitesse doit-on effectuer les compressions thoraciques lors de la RCP?

- a) 80/min
- b) 90/min
- c) Au moins 100/min
- d) 100/min
- e) 120/min



4. A quelle vitesse doit-on effectuer les compressions thoraciques lors de la RCP?

- ~~a) 80/min~~
- ~~b) 90/min~~
- c) Au moins 100/min**
- ~~d) 100/min~~
- ~~e) 120/min~~



5. **Après combien de temps doit-on interrompre la RCP pour évaluer le rythme?**

- a) 1 min
- b) 2 min
- c) 3 min
- d) 1 min 42s 26 centième



5. **Après combien de temps doit-on interrompre la RCP pour évaluer le rythme?**

- a) ~~1 min~~
- b) **2 min**
- c) ~~3 min~~
- d) ~~1 min 42s 26 centième~~



6. En cas d'arythmies défibrillables persistantes ,quel est le moment adéquat pour l'administration de l'adrénaline?

- a) Avant le premier choc
- b) Après le premier choc
- c) Entre le deuxième et le troisième
- d) Entre le troisième et le quatrième



6. En cas d'arythmies défibrillables persistantes ,quel est le moment adéquat pour l'administration de l'adrénaline?

- ~~a) Avant le premier choc~~
- ~~b) Après le premier choc~~
- ~~c) Entre le deuxième et le troisième~~
- d) Entre le troisième et le quatrième**



7. Selon quelle cadence faut-il continuer l'administration de l'adrénaline?

- a) Toutes les minutes
- b) Toutes les 2 minutes
- c) Après le café
- d) Toutes les 3 à 5 minutes



7. Selon quelle cadence faut-il continuer l'administration de l'adrénaline?

- ~~a) Toutes les minutes~~
- ~~b) Toutes les 2 minutes~~
- ~~c) Après le café~~
- d) Toutes les 3 à 5 minutes**



8. Quel médicament doit être administré en concomitance avec l'adrénaline après le troisième choc?

- a) Atropine
- b) Sulfate de Magnésium
- c) Amiodarone
- d) Calcium



8. Quel médicament doit être administré en concomitance avec l'adrénaline après le troisième choc?

- a) ~~Atropine~~
- b) ~~Sulfate de Magnésium~~
- c) **Amiodarone**
- d) ~~Calcium~~



9. Pendant combien de temps peut-on interrompre les compressions thoraciques lors de l'intubation endotrachéale?

- a) 2 min
- b) 10 secondes
- c) 1 min
- d) 30 secondes



9. Pendant combien de temps peut-on interrompre les compressions thoraciques lors de l'intubation endotrachéale?

- a) ~~2 min~~
- b) **10 secondes**
- c) ~~1 min~~
- d) ~~30 secondes~~



10. Profondeur de massage minimale ?

- a) 1 cm
- b) 2 cm
- c) 3 cm
- d) 4 cm
- e) 5 cm
- f) Au feeling



10. Profondeur de massage minimale

- ~~a) 1 cm~~
- ~~b) 2 cm~~
- ~~c) 3 cm~~
- ~~d) 4 cm~~
- e) **5 cm**
- ~~f) Au feeling~~



11. Qu'est ce qui est obsolète pour l'ERC 2010?


- a) Atropine
- b) Voie endotrachéale
- c) Coup de poing sternal
- d) Arrêter les compressions thoraciques lors de la charge du défibrillateur
- e) L'emploi des électrodes du défibrillateur
- f) Votre médecin réanimateur



11. Qu'est ce qui est obsolète pour l'ERC 2010?

- a) Atropine**
- b) Voie endotrachéale**
- c) Coup de poing sternal**
- d) Arrêter les compressions thoraciques lors de la charge du défibrillateur**
- ~~e) L'emploi des électrodes du défibrillateur~~
- ~~f) Votre médecin réanimateur~~





- Hypothermie ?
- Échographie ?

